

ПАМЯТКА ПО БОРЬБЕ С ДОМАШНИМИ МЫШАМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ.

«Граждане осуществляют дератизацию своих жилых помещений, построек, а в сельской местности – домов, садовых участков или других аналогичных территорий средствами, разрешёнными Минздравом России для применения населением в быту.»: (.) 2.6 СП 3.5.3.1129-02 (Санитарно-эпидемиологические правила «Дератизация»).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»: Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 ст. 39 (.) 3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют дератизацию в пределах своих полномочий.

Ключ к успеху - раннее обнаружение признаков появления мышей. Даже единственная мышь на кухне даст знать о своём присутствии, если вы потратите время, чтобы это заметить.

Домашние мыши живут в норах вокруг домов, под гравием и сорной травой, в мусорных кучах, в заброшенных транспортных средствах, сараях.

При обнаружении первых признаков появления мышей (часто это наличие помёта) - сразу примите безотлагательные меры:

1. Обеспечьте грызунонепроницаемость квартиры. Эта мера совершенно необходима как главное условие успешной эффективной дератизации. Если вы обнаружили щели в стенах, шкафах, антресолях, вокруг дверей, окон, в местах прохождения коммуникаций, – заделайте их сами или с помощью ремонтной организации.

2. Перед началом обработки (дератизации) и раскладыванием ядохимикатов и ловушек – освободите все нижние ящики шкафов на кухне, платяных шкафов, освободите кладовки, антресоли, стенные шкафы в т.ч. в туалетах, отодвиньте плиту, холодильник

3. Расставьте клеевые ловушки или мышеловки, разложите родентицидные ядохимикаты, реализуемые через торговую сеть в соответствии с инструкцией по их применению. Приманку восполняют по мере поедания как минимум в течение 10 дней, раскладывая её в местах, недоступных для детей и домашних животных. На полное уничтожение колонии мышей может уйти несколько недель при ежедневном контроле следов их пребывания в жилом помещении и добавлении съеденной приманки.

Сконцентрируйте внимание на кухне. Ищите помёт наверху и на дне кухонной плиты. Проверьте под раковиной, в нижних ящиках кухонных шкафов, а также вдоль стен по периметру помещения. Осмотрите плиту и холодильник вокруг. Убедитесь, что весь помёт убран, чтобы при следующем осмотре было видно – продолжает ли мышь оставаться активной – т.к. это важно для достижения успеха.

Сообщите всем жильцам, чтобы они не пропускали подобные мероприятия

Если пропустить ранние признаки присутствия мышей и не принять при этом вышеуказанных мер, то такая беззаботность приведёт к накоплению мелких колоний, которые расселяются на разных этажах здания. Хорошо обосновавшаяся колония мышей на кухне обычно включает доминирующего самца, двух рожающих самок и 18-20 неполовозрелых детёнышей. Каждая самка приносит в год около 60 мышат, каждый из которых становится половозрелым через два месяца.

Решение проблемы широкого распространения мышей зависит не только от контор по техническому обслуживанию домов, действий служб по борьбе с вредителями, но и от самих жильцов многоквартирных домов – от их совместных действий по поддержанию чистоты и порядка в квартирах, местах общего пользования, на территории вокруг домов а также от их согласованных действий по обеспечению грызунонепроницаемости жилых квартир и соблюдению всех выше описанных мероприятий.